

CUADRO DE COMPETENCIA

BAUSCH+ Health

Material de consulta para uso interno, prohibido compartir con profesionales de la salud

NOMBRE	IVEXTERM	HERKLIN/SCABISAN
PRINCIPIO ACTIVO	Ivermectina. Potente antiparasitario, activo contra ectoparásitos (artrópodos, arácnidos, insectos , y nemátodos) y endoparásitos.	<p>Scabisan crema: Permetrina. Piretroide sintético utilizado en escabicida tópico y pediculicida.</p> <p>Herklin shampoo: Fenotrina. Piretroide sintético escabicida.</p>
ACCIÓN (mecanismo)	<p>Miembro de las avermectinas lactonas macro cíclicas producidas por <i>Streptomyces avermitilis</i>.</p> <p>Inhíbe la sinapsis neuromuscular del insecto¹: Estimula liberación de GABA de las terminales nerviosas y fortalece su unión a los receptores postsinápticos, bloquea la transmisión química a través de la sinapsis nerviosa que utiliza canales aniónicos dependientes de glutamato o canales de cloro dependientes de GABA, lo que interrumpe el estímulo excitatorio de los nematodos y en la unidad neuro-muscular de los artrópodos.</p> <p>REQUIERE SER INGERIDO PARA POR EL PARASITO PARA OCASIONAR SU PARALISIS Y MUERTE. No tiene actividad en huevecillos, solo en etapas larvaria o ninfa y adulta.</p>	<p>Permetrina y Fenotrina actúan sobre la membrana de la célula nerviosa para interrumpir la corriente del canal de sodio que regula la polarización de la membrana; al retrasar la repolarización origina la posterior parálisis y muerte de las plagas.</p>
VENTAJAS (características y beneficios)	<ul style="list-style-type: none"> •Único tratamiento oral contra parasitosis cutáneas, pediculosis y escabiasis. •Presentaciones que refuerzan el tratamiento y garantizan la erradicación. •Tabletas ranuradas y dispersables de fácil y cómoda administración. •Sin necesidad de utilizar shampoo, loción, repelentes o peines anti-piojos. •Su uso se recomienda también en infestaciones masivas, con una alta efectividad en el tx en casos de resistencia.² •Primera línea de tratamiento para escabiasis en diversas guías clínicas.^{4,5} •Mayor efectividad para escabiasis sobre permetrina sin necesidad de realizar lavado de fómites ni medidas higiénicas específicas.³ •Puede utilizarse durante la lactancia.^{3,4} •El uso en grupos de ivermectina oral puede tener múltiples ventajas sobre la terapia tópica, y ha demostrado ser altamente efectiva.³ •El uso de ivermectina oral puede ser más económica que el tratamiento tópico y evita una serie de complicaciones logísticas.³ •Se han realizado estudios en niños con peso <15 kg con baja tasa de efectos adversos.³ 	<p>DESVENTAJAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vía tópica. • Se debe utilizar peine para eliminar liendres. • Tratamientos de repetición. • No se puede utilizar en infestaciones de piojos en cejas, pestañas y pubis. • Puede causar ardor, escozor, quemaduras leves. • Exacerba prurito, edema y eritema causados por piojos. • Permetrina no es recomendable en pacientes asmáticos.¹ <p>FENOTEÍN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Difícil aplicación para escabiosis (todo el cuerpo, durante 8-12 horas). • No se puede utilizar el tratamiento tópico en casos de escoriaciones, lesiones eczematosas, etc. • Estudios recientes indican que permetrina es menos efectiva en el tratamiento de escabiosis.³ • Fenotrina no se encuentra en las Guía de práctica clínica mexicanas para el tratamiento de pediculosis.
INDICACIONES	En el tratamiento sistémico de las ectoparasitosis, como pediculosis, miasis cutáneas, tungiasis, escabiasis; tambien en parasitosis intestinales como ascariasis, enterobiasis, trichuriasis.	<p>Scabisan: Escabiasis</p> <p>Herklin: Pediculosis.</p>
DOSIFICACIÓN (presentaciones)	<p>Caja con 2 y 4 tabletas de 6mg.</p> <p>½ tableta por cada 20kg de peso repitiendo dosis 7 días después</p> <p>DOSIS PONDERAL: 200microgramos/kg</p>	<p>Shampoo 120 y 60ml</p> <p>Lavar el cabello con shampoo normal enjuagar, peinar y secar. Aplicar permetrina en todo el cabello y cuero</p>

NOMBRE	IVEXTERM				HERKLIN/SCABISAN				
DOSIFICACIÓN (presentaciones)					Scabisan Crema 60g Aplicar con un suave masaje sobre cuero cabelludo y hasta las plantas de los pies, se remueve bañándose después de 8 a 14 horas.				
PRECIO	SAN PABLO		FAHORRO	FARMALISTO	Herklin shampoo				
					SAN PABLO		FAHORRO	FARMALISTO	
	c/2tbs. c/4tbs.	\$166.00 \$240.00	\$121.00 \$242.00	\$151.00 \$229.00	60ml 120ml	\$136.00 \$184.00	\$143.00 \$184.00	\$123.00 \$184.00	
					Scabisan crema				
				SAN PABLO		FAHORRO	FARMALISTO		
				60g	\$131.00	\$110.00	\$103.00		
REFERENCIAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cenetec-difusion.com. [citado el 15 de junio de 2022]. Disponible en: http://www.cenetec-difusion.com/CMGPC/IMSS-543-12/ER.pdf 2. Cenetec-difusion.com. [citado el 15 de junio de 2022]. Disponible en: http://www.cenetec-difusion.com/CMGPC/IMSS-602-13/ER.pdf 3. Morgado-Carrasco D, Piquero-Casals J, Podlipnik S. Treatment of scabies. Aten Primaria [Internet]. 2022;54(3):102231. Disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0212656721002651 4. Salavastru CM, Chosidow O, Boffa MJ, Janier M, Tiplica GS. European guideline for the management of scabies. J Eur Acad Dermatol Venereol [Internet]. 2017;31(8):1248–53. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1111/jdv.14351 5. Executive Committee of Guideline for the Diagnosis and Treatment of Scabies. Guideline for the diagnosis and treatment of scabies in Japan (third edition): Executive Committee of Guideline for the Diagnosis and Treatment of Scabies: Executive Committee of Guideline for the Diagnosis and Treatment of Scabies. J Dermatol [Internet]. 2017;44(9):991–1014. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1111/1346-8138.13896 								

NOMBRE	VILONA	VIRAZIDE	CICLOFERON VALEXTRA
PRINCIPIO ACTIVO	RIBAVIRINA. Antiviral, nucleósido sintético análogo de la guanosina, activo mediante enzimas no codificadas por los virus.		ACICLOVIR. VALACICLOVIR
ACCIÓN (mecanismo)	Inhibe el proceso de guanilación de RNAm e Inhibe RNA y DNA polimerasa en respectivos virus y retrotranscriptasa de VIH.	Inhibe el proceso de guanilación de RNAm e Inhibe RNA y DNA polimerasa en respectivos virus.	Inhibe replicación de DNA viral interfiriendo con el DNA polimerasa viral.
VENTAJAS (características y beneficios)	<ul style="list-style-type: none"> • Único antiviral de amplio espectro empleado en varicela y herpes. • De gran utilidad en herpes genital, primario y recurrente. • Rápida acción antiviral al disminuir malestar general y prurito a las 24hrs de tx. • Primera línea de tx en hepatitis B y C. • Eficaz aun 72hrs después de iniciada erupción • CAPS. Medicamento de referencia. • Tratamiento del virus sincitial respiratorio en pacientes inmunocomprometidos e inmunocompetentes.^{1,2} 	<ul style="list-style-type: none"> • Único antiviral de amplio espectro empleado en varicela y herpes. • De gran utilidad en herpes genital, primario y recurrente. • Rápida acción antiviral al disminuir malestar general y prurito a las 24hrs de tx. 	DESVENTAJAS: <ul style="list-style-type: none"> • Resistencia a aciclovir en tratamientos prolongados en pacientes inmunocomprometidos. • Debe ser usado dentro de las 24hrs en que apareció erupción. • Dosis de refuerzo para asegurar eficacia (alargar tx) • Tóxico en células no infectadas.
INDICACIONES	<p>Virus RNA sensibles: Sincicial respiratorio, Influenza A, B y C, coronavirus, sarampión, coxsackievirus, parainfluenza 1 y 3, parotiditis, hepatitis A y C, fiebre de lassa, rubeola, dengue, rinovirus, rotavirus, VIH.</p> <p>Virus DNA sensibles: Herpes simple 1 y 2 (herpes labial, genital), herpes zoster, varicela zoster (varicela), citomegalovirus, adenovirus y hepatitis B.</p>	<p>Virus RNA sensibles: Influenza A y C, coronavirus, sarampión, parainfluenza 1 y 3, parotiditis, hepatitis A y C, fiebre de lassa, rubeola, dengue.</p> <p>Virus DNA sensibles: Herpes simple 1 y 2, herpes zoster, citomegalovirus, varicela zoster, adenovirus y hepatitis B.</p>	<p>Aciclovir: Tratamiento inicial recurrente en lesiones mucocutáneas de herpes simple 1 y 2. Tratamiento coadyuvante de herpes zoster para acelerar cicatrización de lesiones cutáneas.</p> <p>Valaciclovir: Herpes zóster, herpes simple genital y oral y citomegalovirus, Epstein Barr y Virus 6 del Herpes humano</p>
DOSIFICACIÓN (presentaciones)	Caja con 18 caps de 400mg. 1 c/8hrs. Vilona gotas. Frasco gotero 15ml. 10gotas/kg/3 tomas	Caja con 18 caps. de 400mg. 1 c/8hrs. Vilona gotas. Frasco gotero 15ml. 10gotas/kg/3 tomas	Cicloferon Caja 35tbs 400mg. 2tbs, c/4hrs x 7d. Caja 25tbs 200mg. 1tb c/4hrs x 7-10d Crema 2, 5 y 10g. 5 veces al día

NOMBRE	VILONA			VIRAZIDE			CICLOFERON VALEXTRA								
DOSIFICACIÓN (presentaciones)	Vilona solución. Frasco 120ml. 1ml/kg/3 tomas. Tubo crema 5 y 15g. tópica cada 6 –8 horas.			Vilona solución. Frasco 120ml. 1ml/kg/3 tomas. Tubo crema 5 y 15g. tópica cada 6 –8 horas.			Sol. 60 y 125ml. 20ml c/4hrs x 7-10d Espray 50ml. 1disparo 5 veces al día Valextra Caja 7 comprimidos 1000 mg Caja 10 comprimidos 50 mg Caja 42 comprimidos 500 mg								
PRECIO	SAN PABLO FAHORRO FARMALISTO			SAN PABLO FAHORRO FARMALISTO			SAN PABLO FAHORRO FARMALISTO								
	Caps. Crema 5g Crema 15g Gotas 15ml Sol. 120ml	\$1,584.00 \$225.00 \$494.50 \$154.00 \$571.50	\$1766.00 \$233 \$527 \$155 \$579	\$1583.00 \$167.00 \$167.00 \$153.00 \$502.00	Caps. Crema 5g Crema 15g Gotas 15ml Sol. 120ml	\$1713.50 \$265.50 \$502.50 \$145.50 \$541.00	\$1726.00 \$245.00 \$527.00 155.00 \$615.00	\$1,600.00 \$228.00 \$450.00 \$128.00 \$459.00	25lbs 35lbs Crema 5g Crema 10g 60ml 125ml Spray50 ml	\$499.50 \$1095.50 N/A \$303.50 \$307.50 \$489.50 \$603.50	\$495 \$1,000. \$ 150.00 \$274.00 \$279.00 \$452 \$538.00	\$448.00 . \$999.00 \$143.00 \$258.00 \$248.00 \$454.00 \$464.00			
REFERENCIAS	<p>1. Abordaje diagnóstico y terapéutico de la neumonía viral grave [Internet]. Gob.mx. [citado el 15 de junio de 2022]. Disponible en: https://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/guiasclinicas/376GRR.pdf</p> <p>2. Wongsurakiat P, Sunhapanit S, Muangman N. Respiratory syncytial virus-associated acute respiratory illness in adult non-immunocompromised patients: Outcomes, determinants of outcomes, and the effect of oral ribavirin treatment. Influenza Other Respir Viruses. 2022 Jul;16(4):767-779. doi: 10.1111/irv.12971. Epub 2022 Feb 12. PMID: 35150065; PMCID: PMC9178057.</p>														
	<p style="text-align: center;">VALEXTRA</p> <p style="text-align: center;">SAN PABLO FAHORRO FARMALISTO</p> <td data-bbox="1436 805 1583 1006">7 comp 10 comp 42 comp</td> <td data-bbox="1583 805 1730 1006">\$715.50 \$586.00 \$1,898.00</td> <td data-bbox="1730 805 1877 1006">\$718.00 \$614.00 \$1,922.00</td> <td data-bbox="1877 805 2009 1006">\$628.00 \$569.00 \$1897.00</td>												7 comp 10 comp 42 comp	\$715.50 \$586.00 \$1,898.00	\$718.00 \$614.00 \$1,922.00

NOMBRE	CLOBESOL			DERMATOVATE			TABITRAL		
PRINCIPIO ACTIVO	Propionato de clobetasol			Propionato de clobetasol			Halobetasol		
ACCIÓN (mecanismo)	Análogo de la prednisona 4 veces + potente que Microsona. Estimula producción de lipocortina actuando en la inhibición de fosfolipasa A2. Inhibe quimiotaxis (proliferación células) de macrófagos y neutrófilos, suprimiendo actividad de linfocitos y disminuye permeabilidad.						Se relaciona estructuralmente con clobetasol.		
VENTAJAS (características y beneficios)	<ul style="list-style-type: none"> Alta potencia que desinflama en episodios agudos de dermatitis. Rápido efecto que alivia la irritación, ardor y resequeidad de piel. Mejor Precio vs competencia directa. Menor desperdicio de crema debido a su presentación. Líder de mercado. Al ser una presentación con menor cantidad de producto, es más económico y existe menor riesgo de desperdicio de producto 			DESVENTAJAS <ul style="list-style-type: none"> Precio vs presentación. Pocos dermatólogos prefieren clobetasol en ungüento. Desperdicio o provocar la automedicación debido a la presentación de 40g 			DESVENTAJAS <ul style="list-style-type: none"> Evitar usar en cara, mucosas. El ungüento puede causar pústulas, eritema, infección secundaria. En general es menos utilizado. 		
INDICACIONES	Dermatosis inflamatorias resistentes a esteroides de baja potencia. Prurito intenso, dermatitis atópica resistente, eccema, psoriasis, liquen escleroso y/o pénfigo vulgar.			Dermatosis inflamatorias resistentes a esteroides de baja potencia. Prurito intenso, dermatitis atópica resistente, eccema, psoriasis, liquen escleroso y/o pénfigo vulgar.			Tratamiento a corto plazo menor a 2 semanas de dermatosis inflamatorias y pruriginosas.		
DOSIFICACIÓN (presentaciones)	Crem. 30g. 0.05% Aplicar una capa delgada en el área a tratar 1 a 2 veces al día sin exceder 14 días.			Crem 40g. y Ungüento 40g. Aplicar en área afectada 1-2 veces al día.			Tubo 30g. 0.05 g		
PRECIO	SAN PABLO	FAHORRO	FARMALISTO				SAN PABLO	FAHORRO	FARMALISTO
	\$469.00	\$ 467.00	\$449.00	Crm 40g	\$628.00	\$594.00	\$520	\$464	\$519.00
				Ung. 40g	\$603.50	\$594.00			
						\$554 N/A			

NOMBRE	MICROSONA	LOCOID (LIOMONT)	NUTRACORT (GALDERMA)							
PRINCIPIO ACTIVO	Hidrocortisona	Butirato de Hidrocortisona	Hidrocortisona.							
ACCIÓN (mecanismo)	Acción Antiinflamatoria ya que estimula producción de lipocortina actuando en la inhibición de fosfolipasa A2 y por consiguiente la producción de prostaglandinas y leucotrienos. Inhibe quimiotaxis de macrófagos y neutrófilos suprimiendo actividad de linfocitos. Acción anti proliferativa a través de la inhibición en la diferenciación de fibroblastos, producción de colágeno, tejido de granulación y conectivo, retardando el proceso de cicatrización.									
VENTAJAS (características y beneficios)	<ul style="list-style-type: none"> • Tratamiento dual, antiinflamatorio e hidratante. • Terapia esteroidea de baja potencia y rápida acción. • Mejor precio vs competencia directa • No necesita vendaje oclusivo. 	DESVENTAJAS: Precio vs. Microsona.	DESVENTAJAS: • Precio vs. Microsona • Desperdicio o provocar la automedicación debido a la presentación de 60g.							
INDICACIONES	Tratamiento tópico de dermatosis inflamatorias y reaccionales. Dermatitis atópica, dermatitis por contacto, prurigo por insectos, dermatitis seborreica, liquen simple crónico, pénfigo benigno familiar, parapsoriasis, prurito anal y hemorroides.	Tratamiento tópico de dermatosis inflamatorias, pruriginosas y/o alérgicas, no infectadas. Por ejemplo: eccema seborreico o de contacto, dermatitis atópica, fotodermatitis, psoriasis vulgar, liquen plano simple crónico, escleroso y atrófico, neurodermatitis.	Tratamiento de la dermatitis atópica, dermatitis por contacto, eccema de pies y manos, eccema numular, neurodermatitis, liquen plano y dermatitis por estasis.							
DOSIFICACIÓN (presentaciones)	Crema 30g 1%. Aplicar una capa delgada en el área a tratar 1 a 4 veces al día.	Crema 0.1% 15 y 30g. aplicar en zona afectada 2-3 veces al día. Compresas oclusivas en psoriasis.	Crema 60g 1%. aplicar 2- veces al día Loción frasco 120ml. Aplicar 2- 3 veces al día.							
PRECIO	SAN PABLO	FAHORRO	FARMALISTO	SAN PABLO	FAHORRO	FARMALISTO	SAN PABLO	FAHORRO	FARMALISTO	
	N/A	\$217.00	\$183.00	Crn 15g Crn. 30g	N/A \$314.50	\$143.00 \$290.00	\$148.00 \$289.00	Crn 60g Sol 120ml	\$369.50. \$626.00	\$370.00 \$641.00

NOMBRE	EFUDIX/ EFUDIX LPS		ALDARA (SANFER)	QUIMARA (LIOMONT)
PRINCIPIO ACTIVO	5-Fluororacilo		Imiquimod	Imiquimod
ACCIÓN (mecanismo)	Actúa como antimetabolito interfiriendo en la síntesis de DNA y de RNA por inhibición de la timidilato sintetasa que cataliza la metilación del ácido deoxiuridílico a ácido timidílico, un precursor de DNA: Inhibe las pirimidinas. Inhibe formación de uroracilo en virus con RNA Inhibe formación de tinina en virus con DNA. Inhibe síntesis proteica del virus Inhibe replicación celular.		Inhibidor de la respuesta inmune local. Respecto al mecanismo de acción para QA se ignora.	
VENTAJAS (características y beneficios)	<p>Al contar con ambas presentaciones hay un mayor espectro en cuanto a las indicaciones.</p> <p>Gracias a su perfil de seguridad no requiere ser retirado a diferencia de la competencia (Imiquimod).</p> <p>LPS- formulación liposomal que libera de forma sostenida y gradualmente 5-fluororacilo, adicionado con liposomas. Debido a su concentración y a los liposomas ocasiona menores efectos adversos, por lo que se sugiere su uso en dermatología.</p> <p>Menor inflamación sin disminución de efecto terapéutico.</p> <p>En QA 71% de eficacia en 4 semanas. Puede ser utilizado en monoterapia o combinado con dermoabrasión y crioterapia.</p>		<p>DESVENTAJAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Se debe de retirar la crema aplicada después de 6-10hrs. •No se puede utilizar en cérvix ni vagina. •Costo vs efudix •Puede debilitar el látex de preservativos. •Pueden causar hipo o hiperpigmentación localizada •No puede ser utilizado en infecciones. 	
INDICACIONES	<p>1ª. Línea de tratamiento en Queratosis Actínica. Enfermedad de Bowen con una tasa de curación del 90-100% Epiteliomas basocelulares superficiales. (cáncer basocelular inicial) Epidermodisplasias verruciforme Verruga vulgar, 1ª elección en verrugas planas, queratoacantoma, condiloma y papiloma. Auxiliar en tx psoriasis en uñas. Lesiones por VPH (condilomas y/o papiloma), lesión escamosa de bajo grado (displasia leve NIC-1, 2), neoplasia intraepitelial vaginal leve, moderada y severa (NIVA 1,2 y 3), condilomatosis vaginal y vulvar, y verrugas genitales.</p>		<p>Tratamiento tópico de verrugas genitales y perianales externas (condilomas acumulados) 12 años en adelante.</p> <p>QA en etapas clínica y subclínica. Carcinoma de cel. Basales superficial (crema al 5%)</p>	
DOSIFICACIÓN (presentaciones)	<p>LPS 0.5% crm 20g. En QA 1 al día por 4 sem En Verrugas aplicar con parche oclusivo 1 vez al día por 2-3 sem En carcinoma basocelular 2 veces al día durante 5 semanas</p> <p>Lesiones papiloma (cérvix, vagina) 1 vez x 8sem Lesiones pene y vulva 2-3 veces x 4-6 sem</p> <p>Efudix Crema al 5%, 20g. En dermatología. En QA 1-2 veces al día x 2-4 sem Verrugas 2 veces al día x 2-3 sem Carcinoma basocelular 2 veces al día x 5 sem</p>	<p>Crema 5% caja con 3, 6 y 12 sobres de 250mg</p> <p>Crema 3.75% caja con 7,14 y 28 sobres de 250mg.</p> <p>Aplicar previo aseo y perfectamente seca zona a tratar.</p> <p>En Verrugas genitales y perianales: al a5% aplicar una capa delgada hasta desaparecer 3 veces por semana antes de dormir x 16 semanas.</p> <p>Crema al 7.5% aplicación diaria x 8sem En QA. Crema al 5% aplicar x las noches 2 veces por semana x 16semanas.</p>	<p>Tubo con 3 y 5g</p> <p>Caja con 6,12, 24,36 y 48 sobres de 250mg</p> <p>Aplicar previo aseo y perfectamente seca zona a tratar.</p> <p>En Verrugas genitales y perianales: al 5% aplicar una capa delgada hasta desaparecer 3 veces por semana antes de dormir x 16 semanas.</p> <p>En QA. Crema al 5% aplicar x las noches 2 veces por semana x 16semanas</p>	

NOMBRE	EFUDIX/ EFUDIX LPS			ALDARA (SANFER)	QUIMARA (LIOMONT)		
		SAN PABLO	FAHORRO	FARMALISTO			
PRECIO	Efudix Crm 20g Efudix LPS 20g				Aldara Crema 2x1 6 Crema Paquete		
					SAN PABLO	FAHORRO	FARMALISTO
		\$758.00	\$843.00	\$757.00	1,582.50	\$ 1,611.0	\$1,349.00
		\$898.00	\$1,060	\$897.00			
					Aldara 14 Sobres Caja		
					SAN PABLO	FAHORRO	FARMALISTO
			\$1,7 45	\$1,853.00	\$1526.00		
			Aldara 14 Sobres Caja				
			SAN PABLO	FAHORRO	FARMALISTO		
			Tubo 3g	\$1,128	\$ 1,179	\$1,079.00	
			Tubo 5g	\$1,291.50	N/A	\$1,290.50	

NOMBRE	ARRETIN	RETIN-A	RETINOL ELITE (FARMAPIEL)
PRINCIPIO ACTIVO	Ácido retinoico	Tretinoína	Dióxido de titanio; fps 15; retinol (vitamina a); vitamina e.
ACCIÓN (mecanismo)	Principio activo comedolítico por excelencia que disminuye la adhesividad de células cornificadas favoreciendo la expulsión de material del comedón. En fotodaño, estimula la diferenciación epidérmica y producción de colágeno, así como gránulos de queratohialina, disminuye la actividad de los melanocitos	La tretinoína promueve la descamación de células cornificadas y aumenta la liberación de los corneocitos del folículo. Por incremento de la actividad mitótica del epitelio folicular, la tretinoína también incrementa la velocidad de reorganización de la capa delgada de los corneocitos adheridos libremente. Por medio de estas acciones, la tretinoína reduce la formación del microcomedón, la lesión precursora del acné vulgaris.	La vitamina A favorece los procesos celulares como crecimiento y diferenciación, revitalizando la piel fotodañada. La vitamina E previene la formación de radicales libres protegiendo y revitalizando la piel dañada.
VENTAJAS (características y beneficios)	Posee efectos tanto en dermis como epidermis, actuando como modulador y diferenciador celular a través de la interacción de receptores nucleares para retinoides. No modifica la composición lipídica de la superficie cutánea y no tiene acción directa sobre bacteria de acné, sin embargo, deteriora condiciones propicias para crecimiento. Mejoría clínica en los 2-4 meses de tratamiento	DESVENTAJAS: Precio vs. Arretín	DESVENTAJAS: Precio vs. Arretín
INDICACIONES	Acné vulgaris, en casos de presencia de comedones, pápulas y pústulas. Tratamiento de foto envejecimiento, foto daño cutáneo (heliodermatitis), hiperchromías e hiperqueratosis.	Tratamiento tópico de acné vulgar y fotodaño.	Fotodaño de la piel
DOSIFICACIÓN (presentaciones)	Crema al 0.05% 30g. Para acné: aplicación diaria por la noche. Aplicación de eritema y descamación de 7 a 10 días después.	Crema al 0.05% 40 g. Una vez al día por las noches por un periodo mínimo de 10 a 12 semanas.	Tubo con 30 g Aplicar durante la primera semana en las noches sobre la piel limpia y seca; a partir de la segunda semana y dependiendo de la tolerancia mostrada por el paciente, se puede aplicar en la mañana y en la noche. Se recomienda siempre el uso de protector solar
PRECIO			
	SAN PABLO FAHORRO FARMALISTO	SAN PABLO FAHORRO FARMALISTO	SAN PABLO FAHORRO FARMALISTO
	CRM30G \$297.00 \$268.00 \$296.00	CRM40G \$620 \$633 \$559.00	N/A N/A \$714.94

NOMBRE	CUTACLIN			CLIDETS (ITALMEX)			DALACIN T (PFIZER)		
PRINCIPIO ACTIVO	Fosfato de Clindamicina en gel			Clindamicina gel			Clindamicina gel		
ACCIÓN (mecanismo)	Inhibe síntesis proteica bacteriana al unirse a la de la subunidad ribosomal 50s afectando el ensamblaje de ribosomas y el proceso de traducción.								
VENTAJAS (características y beneficios)	<ul style="list-style-type: none"> •Actividad antimicrobiana contra cocos gram+ aerobios, bacterias gram+, gram- anaerobias y microaerofilicas. •Reduce concentraciones de ácidos grasos libres en el sebo, los cuales tienen potencial comedogénico y son responsables de lesiones inflamatorias de acné. •Por su vehículo libre de alcohol no reseca y reduce los fenómenos irritativos del tx. •De acuerdo con la GPC se recomienda en acné moderado y grave, de 6 a 12 semanas y en mujeres con indicaciones ginecológicas por tratamiento hormonal.¹ 			DESVENTAJAS					
				•Costo vs competencia.					
INDICACIONES	Tratamiento del acné vulgar inflamatorio en piel seca, grasosa y normal. Piodermias por Streptococcus, Staphylococcus y anaerobios.			Tratamiento tópico para acné vulgar			Auxiliar en el tratamiento de acné vulgaris		
DOSIFICACIÓN (presentaciones)	Tubo 30g gel. Previo aseo de piel a tratar, aplicar una película delgada de gel dos veces al día, mañana y tarde.			Tubo 30g gel. Aplicar 1 vez al día sobre toda el área afectada x 6 semanas.			Tubo 7.5 y 30g gel. Aplicar 2 veces al día en el área afectada.		
PRECIO	SAN PABLO FAHORRO FARMALISTO			SAN PABLO FAHORRO FARMALISTO			SAN PABLO FAHORRO FARMALISTO		
	\$324.50	N/A	\$283.00	\$397.00	\$348.00	\$325.00	\$366.	\$311.00	\$310.00
<p>1. Cenetec-difusion.com. [citado el 16 de junio de 2022]. Disponible en: http://www.cenetec-difusion.com/CMGPC/SS-224-09/ER.pdf</p>									

NOMBRE	DERFINA			UNASAL					
PRINCIPIO ACTIVO	Butenafina			Tterbinafina					
ACCIÓN (mecanismo)	Antifúngico sintético del grupo de las bencilaminas. Acción a través de la inhibición de la enzima escualeno mono oxigenasa (escualeno 2,3-epoxidasa), necesaria para la síntesis de esteroides a partir de la epoxidación del escualeno, provocando deficiencia del ergosterol necesario para formar las membranas fúngicas, así como acumulación de escualeno, lo que provoca la muerte del hongo			Alilamina, antimicótico de amplio espectro, actúa por inhibición de la escualeno-epoxidasa en la membrana de la célula fúngica específicamente en la biosíntesis esterólica ocasionando falta de ergosterol y acumulación intracelular de escualeno, provocando así la muerte fúngica					
VENTAJAS (características y beneficios)	<ul style="list-style-type: none"> • Su eficacia se explica por su doble mecanismo de acción: Inhibición de la síntesis de ergosterol (componente de las membranas fúngicas) y su acción fungistática.¹ • Acción fungiestática sobre levaduras como <i>Candida albicans</i> y <i>Candida parapsilosis</i>. • Permanece en el estrato córneo hasta por 7 días. • La concentración dérmica de DERFINA es suficiente para erradicar de manera rápida a los dermatofitos más comunes. • DERFINA. no provoca eventos adversos sistémicos, porque prácticamente no se absorbe, aun empleándola hasta por 5 semanas. • En el caso remoto de absorción sistémica, no interfiere con el citocromo P-450 (enzima que ayuda a fármacos a metabolizarse en hígado), lo que es una ventaja contra los antifúngicos azoles. • Posee un efecto antiinflamatorio intrínseco que contribuye al alivio más rápido de los síntomas. • Presenta una concentración mínima inhibitoria muy baja en comparación con otros antimicóticos tópicos.¹ • En la mayoría de los estudios en tiña de pie, cuerpo e ingle fue superior contra placebo, clotrimazol y terbinafina tópicos.¹ • Presenta una tasa de curación clínica y micológica del 95% en casos de dermatofitosis¹ 			DESVENTAJAS: <ul style="list-style-type: none"> • Única presentación en crema. 					
INDICACIONES	Tratamiento de tiña de los pies (pie de atleta), tiña del cuerpo e inguinal y pitiriasis versicolor causadas por hongos susceptibles.			Tratamiento de dermatomicosis (tiña capitis, corporis y cruris) y onicomosis causadas por dermatofitos <i>Trichophyton</i> , <i>Epidermophyton floccosum</i> , Pitiriasis versicolor causada por <i>Pityrosporum orbiculare</i> (<i>Malassezia furfur</i>) e infecciones causadas por levaduras del género <i>Candida</i> .					
DOSIFICACIÓN (presentaciones)	Caja con tubo con 30 g de crema. Frasco con solución en espray con 30 mL. Para tiña de los pies, aplique cada 12 horas por 1 semana o una vez al día por 4 semanas. Para tiña de la región crural (tiña inguinal) y tiñas localizadas en otras partes del cuerpo, aplique 1 vez al día por 2 semanas.			Tubo 15g crema Tiña corporis, cruris y pedis: Aplicar 1 vez al día durante 1 semana. Candidiasis cutánea: 1 a 2 semanas. Pitiriasis versicolor: 2 semanas.					
PRECIO			SAN PABLO	FAHORRO	FARMALISTO		SAN PABLO	FAHORRO	FARMALISTO
	Crm. 30g Espray 30ml			\$ 237.00 \$226.00	\$236.00 \$225.00	Crm 15g	\$103.00	\$98.00	\$104.00

1. Medigraphic.com. [citado el 16 de junio de 2022]. Disponible en: <https://www.medigraphic.com/pdfs/cosmetica/dcm-2007/dcm074f.pdf>