

BAUSCH+Health

Argentafil/Cutaclin

Repaso

Dr. Carlos Martínez
Especialista médico
carlos.martinez2@bauschhealth.com
Teléfono: +52 55 4373 1253



Argentafil

Sulfadiazina de Plata 1%





- Crema 1%
- Suspensión 1%



Indicaciones

- Infecciones cutáneas primarias y secundarias causadas por bacterias gram positivas, gram negativas, hongos y levaduras.



Argentafil

Sulfadiazina de Plata 1%



- Crema 1%
- Suspensión 1%



Puntos clave

- Erradica a los microorganismos en las primeras dos a tres semanas de tratamiento
- Favorece la reepitelización de la herida.




Farmacología

Argentafil

Sulfadiazina de Plata 1%



- Crema 1%
- Suspensión 1%



Efectividad con buen perfil de seguridad


Argentafil

Sulfadiazina de Plata 1%

- Crema 1%
- Suspensión 1%



Farmacología



Con efecto bactericida y bacteriostático

Argentafil

Sulfadiazina de Plata 1%



- Crema 1%
- Suspensión 1%

Dosis y vía de administración

Argentafil® se aplica sobre la lesión (limpieza previa), una o dos veces al día con o sin vendaje oclusivo.



Argentafil

Sulfadiazina de Plata 1%



- Crema 1%
- Suspensión 1%



¿Porqué utilizar Argentafil?

La prevención de infecciones en el manejo de heridas es clave



T	I	M	E
Tissue / Tejido	Infection / Infección	Moisture / Exudado	Edge / Bordes epiteliales
Eliminación del tejido no viable	Control de la carga bacteriana	Correcto control del exudado	Actuación en heridas estancadas

Argentafil

Sulfadiazina de Plata 1%


- Crema 1%
- Suspensión 1%



¿Porqué utilizar Argentafil?

Argentafil es uno de los antimicrobianos más utilizados por:

- Seguridad
- Tolerabilidad
- Eficacia
- Accesible





Generalidades

Indicaciones

Acné vulgar inflamatorio
Piodermas

Mecanismo de acción

Inhibe la síntesis de proteínas al unirse a la subunidad 50S del ribosoma bacteriano

Contraindicaciones

enteritis regional, colitis ulcerativa y colitis pseudomembranosa

Dosis y vía de administración

Previo aseo, aplicar película delgada dos veces al día.

Forma farmacéutica

Vehículo a base de emolientes y humectantes para la piel con un pH similar al fisiológico de la piel.

Patogenia

El acné es una enfermedad que afecta la unidad pilosebácea.

- Retención de queratina
- Producción incrementada de sebo
- Sobreinfección *C. acnes*
(*Propionibacterium acnes*)
- Inflamación



Fuente: Klaus Wolff, Richard Allen Johnson, Arturo P. Saavedra: *Fitzpatrick. Atlas de Dermatología Clínica, 7e*:
www.accessmedicina.com
Derechos © McGraw-Hill Education. Derechos Reservados.



Indicaciones

Acné vulgar

Sí

- Reduce proliferación de C. acnes
- Puede actuar en procesos antiinflamatorios
- Pieza clave en el tratamiento de acné
- Complmenta el tratamiento con retinoides

No

- Utilizar como monoterapia



Topical clindamycin for acne vulgaris: analysis of gastrointestinal events

Natalia M. Pelet del Toro^a, Andrew Strunk^a, Jashin J. Wu^b, Linda Stein Gold^c, James Q. Del Rosso^{d,e,f}, Robert T. Brodell^g and George Han^a

Acné leve a moderado

La mejor combinación

Combinar:

- Clindamicina
- Retinoide
- BPO



Indicaciones

Piodermas

Grupo de infecciones superficiales de la piel y la estructura folicular

Causas

S. aureus

Estreptococos del grupo A



Impetigo Contagioso



Impetigo Ampolloso



Ectima



Foliculitis



Forunculosis

Indicaciones

Piodermas

Grupo de infecciones superficiales de la piel y la estructura folicular



Foliculitis




Causas

S. aureus

Estreptococos del grupo A

FISIOPATOGENIA DE LA FOLICULITIS



Mecanismo de acción

Inhibe la síntesis de proteínas al unirse a la subunidad 50S del ribosoma bacteriano



Eficacia sobre *C. acnes*, aerobios y anaerobios





Absorción



Probabilidad de efectos secundarios

Mecanismo de Acción de la Clindamicina




Combina actividad bacteriostática frente a *Cutibacterium acnes* con propiedades antiinflamatorias, contribuyendo al control de las lesiones inflamatorias del acné

Dosis y vía de administración



1. LIMPIEZA

Limpiar con jabón suave y secar.



2. APLICACIÓN

Aplicar una película delgada uniformemente en el área afectada (no solo sobre las pústulas).



Usar 2 veces al día (Mañana y Noche).

3. FRECUENCIA

Usar 2 veces al día (Mañana y Noche).

Puntos clave


- Mejoría significativa del acné leve a moderado tras 12 semanas de tratamiento
- Eficacia clínica en la evaluación global del acné y en la reducción del número total de lesiones
- Bien tolerada y buen perfil de seguridad comparable al de dapsona tópica al 5%

A comparative study of efficacy and safety of topical clindamycin 1% gel versus topical dapsona 5% gel in acne vulgaris over face: a prospective randomized double-blind study

Jyoti P. Gadhvi^{1*}, Devendra S. Kushwah¹, Anubhav Garg², Seema Gogoi¹

¹Department of Pharmacology, Gajra Raja Medical College, Gwalior, Madhya Pradesh, India


²Department of Dermatology, Gajra Raja Medical College, Gwalior, Madhya Pradesh, India



Review

Scientific Rationale and Clinical Basis for Clindamycin Use in the Treatment of Dermatologic Disease

Maria K. Armillei ¹, Ivan B. Lomakin ², James Q. Del Rosso ^{3,4,5}, Ayman Grada ⁶
and Christopher G. Bunick ^{1,2,*}



Evidencia respaldada

- Actividad frente a bacterias implicadas en las piodermas, especialmente *Staphylococcus aureus* y *Streptococcus pyogenes*
- Propiedades antiinflamatorias que pueden contribuir al control de la respuesta inflamatoria en infecciones cutáneas bacterianas
- Alternativa terapéutica establecida para la foliculitis bacteriana superficial.
- Versatilidad en dermatología infecciosa por su amplio espectro